



KEVILI
Põllumeeste ühistu

Minu tähelepanekud ja millele mõelda?

Meelis Värnik

Taimikasvatusspetsialist

Maa meid toidab



Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfond:
Euroopa investeeringud
maapiirkondadesse

Eesti keskmised sademed

Eesti keskmised sademed									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Keskmine
Jaanuar	61	26	36	55	44	46	61	67	50
Veebruar	70	30	22	38	76	17	49	31	35
Märts	20	41	20	57	45	31	5	46	37
Aprill	48	49	41	4	36	23	29	24	31
Mai	17	14	17	49	32	83	49	12	42
Juuni	107	70	42	49	77	31	42	28	69
Juuli	78	48	26	68	89	50	71		72
August	133	86	81	50	57	121	46		83
September	28	88	86	85	53	36	46		64
Oktoober	39	115	77	105	66	63	45		73
November	73	67	25	54	55	80	38		63
Detsember	29	78	39	61	39	37,5	54		53
KOKKU	703	712	512	675	669	618,5	535	208	672
Eesti keskmised sademed ajavahemikus									
veebr-juuni	262	204	142	197	266	185	174	141	214
märts-mai	85	104	78	110	113	137	83	82	110
märts-juuni	192	174	120	159	190	168	125	110	179

Millele mõelda?

- ☞ Mis on minu rohumaa keskmised saagikused?
 - ☞ Milline olnud kõige kehvemal aastal?
 - ☞ Planeeri reaalselt!
- ☞ Milline on minu rohumaaade struktuur?
 - ☞ Vanus
 - ☞ Liigiline koosseis
 - ☞ Kas oleks midagi vaja muuta?
- ☞ Niidukõrgus on väga madal, sellepärast ädala kasv aeglane.
- ☞ Kas minu väetamine on piisav?
- ☞ Kui rajan rohumaad, kas külvinorm/tehnoloogia on piisavad?

Uue rohumaa rajamine

- ☞ Kas rajada kevadel või sügisel?
 - ☞ Kas rajada puhaskülvis või allakülvina?
 - ☞ Mis on õige segu, õiged liigid? Lutsern/ristik?
 - ☞ Külvikord planeerida 3-4 aastat ette.
 - ☞ Kui külvata sügisel, mida selleks teha?
 - ☞ Võidab 0,5-1,0 aastat ja ... niidet
 - ☞ Peale terasaagi koristust?
 - ☞ Millal ja mis kultuuri järgi?
 - ☞ Kas liblikõielised suudavad talvituda?
 - ☞ Jälgi kahjureid liblikõielistel
 - ☞ Hiljemalt 5-8. august liblikõielisterikka segu puhul.
 - ☞ Varist ei jää segama
 - ☞ Peale tervikkoristust?
 - ☞ Võimalik valida rohkem sobivamaid niiskusolusid!?

„Paranduskülvid“ ja uuendamine

- ☞ „Paranduskülvid“ ei too edu!?
- ☞ Kamarasse saab külvata ebaõnnestunud rohumaa külvile enamasti 1. aastal
 - ☞ Kui pole tülikaid umbrohtusid
 - ☞ Pigem kasutada kiire arenguga liike (karjamaa raihein, punane või valge ristik, pealiskõrrelistest harilik aruhein, timut.
- ☞ Vanad rohumaad rajada ümberkülvi teel
 - ☞ Vana kamar hävitada, mulda viia.
 - ☞ Mullaharimise kvaliteet
 - ☞ Kui on vaja siluda, siis künda.

Sobivad liigid turvasmuldadele (segud)

- ☞ Põuakartlikule turvasmullale:
 - ☞ Roog-aruhein
 - ☞ Ohtetu luste
- ☞ Parasniiskel turvasmullale:
 - ☞ Päideroog
 - ☞ Roog-aruhein
 - ☞ Timut
 - ☞ Aasnurmikas
 - ☞ Roosa ristik
- ☞ Ajutiselt liigniiskel turvasmullale:
 - ☞ Päideroog
 - ☞ Roosa ristik (kui heina ei tee)

Teravilja/herne tervikkoristus

- ☞ Rukis
 - ☞ Silorukki sordid
- ☞ Talitritikale
- ☞ Talioder
- ☞ Hernes?!
- ☞ Teravilja ja herne segatis
 - ☞ Võimalus külvata uus kultuur
 - ☞ Uus rohumaa
 - ☞ Taliraps õigeaegselt
 - ☞ Teravilja ja herne segatis

Kuula/Uuri teiste kogemusi!!

Mais

- ☞ Liiga varajasi külve mitte teha!
- ☞ Jälgi FAO-d
- ☞ 2 herbitsiidi – taaskord taimekasv pidurdunud
- ☞ Maisi nii vähe häirida kui võimalik
- ☞ Sellel aastal on maisi pinnad suured, kas saab õigeaegselt koristatud?

Põud

- ☞ Süsinikumajandus – mitte kauplemiseks
 - ☞ Põuakindlus, riskide juhtimine
- ☞ Vedelsõnniku efektiivsem kasutamine
 - ☞ Kultuuridega maale
- ☞ Mulla pind peab olema kaetud!
 - ☞ Niiskuse kadu!



Täna kuulamast!



Maa meid toidab



PÕLLUMEESTE ÜHISTU KEVILI

Turu 34, 50104 Tartu

kevili@kevili.ee

www.kevili.ee



KEVILI
Põllumeeste ühistu

