





Kaasrahanud  
Euroopa Liit


# ETSAÜ FARMIDEST REALISEERITUD NUUMIKUTE LIHA- JA RÜMBAKVALITEET (01.01. - 31.10.2025)

Aarne Põldvere, ETSAÜ  
Deivi Lomp, ETSAÜ  
Alo Tänavots, EMÜ



EESTI  
TÕUSIGADE  
ARETUSÜHISTU

ESTONIAN PIG BREEDING ASSOCIATION




# 2025. A 10 KUUGA

- 129 342 rümba andmed 3-st lihatööstustest.
- 26 farmi 129 164 rümba andmed.
- 1254 rümpa 5-st farmist hinnati katseliselt.
- 1094 rümba 9 tõukombinatsiooni andmed.




Foto: Alo Tänavots

# REALISEERITUD SIGADE RÜMPADE LIHASUSE MUUTUSE DÜNAAMIKA




Rümpade arv: **2020** - 47 506, **2021** - 92 097, **2022** - 87 664,  
**2023** - 86 953, **2024** - 102 540, **2025** - 129 342

# REALISEERITUD SIGADE RÜMPADE LIHASUSE MUUTUSE DÜNAAMIKA




- S-klassi osakaal suurenes kuni 2022. aastani ja langes seejärel järjepidevalt
- 2024–2025 domineerib E-klass enam kui poole realiseeritud rümpadega
- S-klassi osakaal 2025. aastal on ligikaudu 43%
- U-klassi osakaal on kogu perioodi vältel marginaalne
- Kvaliteedinihe S-klassist E-klassi mõjutab otseselt tootjate tulukust


# NUUMIKUTE RÜMPADE KVALITEEDINÄITAJAD FARMITI



# NUUMIKUTE RÜMPADE KVALITEEDINÄITAJAD FARMITI



# NUUMIKUTE RÜMPADE KVALITEEDINÄITAJAD FARMITI




# SEUROP-SÜSTEEMI UUENDAMINE


- Kehtiv UltraFOM 300-I põhinev searümpade klassifitseerimissüsteem on tehniliselt ja metoodiliselt vananenud.
- Eesti seapopulatsiooni geneetiline struktuur erineb oluliselt 1993. ja 2003. aasta dissektsioonikatsete ajast.
- Otsustati minna üle uuele tailihasisalduse määramise metoodikale, mille referentsiks on teiseldatav kompuutertomograafia (CT).
- Alustatud on EK-le esitatava Protokoll I koostamist Eesti seapopulatsiooni kirjeldamiseks.
- Uuendamise ettevalmistuses osalevad ETSAÜ, PTA, lihatööstused, seadmetootjad ja IFIP.
- Sigade Aafrika katk on ajutiselt pidurdanud katsete läbiviimist ja uue süsteemi rakendamist.




# ETSAÜ KULDIJAAMA KULTIDE JÄRGLASTE RÜMPADE KVALITEEDINÄITAJAD FARMITI



# ETSAÜ KULDIJAAMA KULTIDE JÄRGLASTE RÜMPADE KVALITEEDINÄITAJAD FARMITI




# ETSAÜ KULDIJAAMA KULTIDE JÄRGLASTE RÜMPADE KVALITEEDINÄITAJAD FARMITI





- Sama geneetika korral varieerub S-klassi osakaal farmiti 22–49%.
- Farm 1 saavutas kõrge S-klassi osakaalu.
- Pikem nuumiperiood suurendab E- ja U-klassi osakaalu.
- Madal S-klassi osakaal on seotud suurema rasvkatega, mitte geneetikaga.
- Realiseerimisaja täpne juhtimine on SEUROP-tulemuste võtmetegur.


# ETSAÜ KULDIJAAMA KULTIDE JÄRGLASTE RÜMPADE KVALITEEDINÄITAJAD RISTAMISKOMBINATSIOONITI





# ETSAÜ KULDIJAAMA KULTIDE JÄRGLASTE RÜMPADE KVALITEEDINÄITAJAD RISTAMISKOMBINATSIOONITI



# DJUROKI KULTIDE MÕJU JÄRGLASTE RÜMPADE KVALITEEDINÄITAJATELE FARMITI



# DJUROKI KULTIDE MÕJU JÄRGLASTE RÜMPADE KVALITEEDINÄITAJATELE FARMITI



# KOKKUVÕTE



- Pärast 2022. aastat on S-klassi osakaal langenud ja E-klassi osakaal suurenenud.
- Lihatööstuste lõikes on SEUROP-jaotus erinev, eriti paistab silma LT3 madalam S-klass.
- Farmide ja ristamiskombinatsioonide vaheline erinevus on suur ja süsteemne.
- Varasem realiseerimine ja suurem kasvukiirus annavad õhema seljapeki ja suurema S-klassi osakaalu.
- Geneetika loob eeldused, kuid lõpptulemuse määrab realiseerimisaja ja nuuma juhtimine.